

DenaVin 3®

Sublingvalni sprej
Dodatak prehrani

Vitamin D3 400 i.j.

Uljna suspenzija sa doznim dispenzerom.

DenaVin 3 400 i.j. sublingvalni sprej sadrži vitamin D3 (holekalciferol) i preporučuje se kao nadopuna vitamina D.

- Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji/iskorištanju kalcija i fosfora
- Vitamin D učestvuje u održavanju normalnih nivoa kalcija u krvi
- Vitamin D doprinosi održavanju zdravlja kostiju i zuba
- Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije mišića
- Vitamin D pomaže normalno funkcionisanje imunološkog sistema
- Vitamin D učestvuje u diobi ćelija

Sastojci: holekalciferol (vitamin D3) i MCT ulje (triglyceridi srednje dužine lanca).

20 ml uljna suspenzija sadrži 400 doza.

Jedna doza sadrži 10 µg (400 i.j.) vitamina D3.

Sastojak	1 doza sadrži	%RV/doza	%PU/doza
Vitamin D3 (holekalciferol)	10 µg (400 i.j.)	100	200

RV-referentna vrijednost za označavanje hranjive vrijednosti hrane za odojčad i malu djecu

PU-preporučeni unos za prosječno odraslo lice 8400 kJ/2000 kcal

Način upotrebe

Prije prve upotrebe DenaVin 3 sublingvalnog spreja, dozni dispenzer mora biti pripremljen. Priprema je jednostavna: držite proizvod u uspravnom položaju, pritisnite dozni dispenzer nekoliko puta dok suspenzija ne izađe iz dispenzera. Pritisnite još 2 puta do kraja. Proizvod je spremан за upotrebu. Provjerite da li je dozni dispenzer pritisnut do kraja i da ste uzeli punu dozu. Navedenu proceduru nije potrebno ponavljati tokom naredne primjene.

Preporučena dnevna doza

Dojenčad u toku prve godine života: 1 doza dnevno.

Djeca starija od jedne godine i adolescenti do 18 godina: 1-2 doze dnevno.

Odrasli: 1-2 doze dnevno.

DenaVin 3 sublingvalni sprej se može primijeniti direktno u usta, pod jezik, ili u kašičici sa malo tečnosti.

Mjere opreza/upozorenja

Ne uzimati istovremeno sa drugim proizvodima koji sadrže vitamin D. Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu. Držati izvan dohvata djece. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak

proizvoda. Dodaci prehrani ne zamjenjuju uravnoteženu ishranu i zdrav način života i ne mogu se koristiti kao nadomjestak (zamjena) za raznovrsnu ishranu.

Rok trajanja: dvije godine.

Način čuvanja

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 8°C do 25°C, u originalnom pakovanju, kako bi se sadržaj zaštitio od sunca.

Proizvodač

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina
u saradnji sa
EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa, Poljska

Nosilac odobrenja

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva:
04-33-7613/22-DP od 21.08.2023.